



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : NPS

VISANNE® (即-安) 地诺孕素

这是什么传单

本传单回答了有关 Visanne 的一些常见问题。它不包含所有可用的

信息。它不能代替与您的医生或药剂师交谈。

所有药物都有风险和益处。您的医生已经权衡了您服用 Visanne 的风险和他们期望它为您带来的好处。

如果您有任何顾虑，或不确定是否服用该药，请咨询您的医生或药剂师以获得更多建议。

将此传单与药物一起保存。
您可能需要把它重读一遍。

什么是维桑用于

Visanne 用于治疗疼痛症状

子宫内膜病变（子宫内膜的移位组织）。

Visanne 含有一种孕激素，地诺孕素。

每天服用一片 Visanne 片剂会导致子宫内膜组织收缩，并减少相关的抱怨，如骨盆疼痛和每月疼痛的出血。

如果您对为什么会这样有任何疑问，请咨询您的医生已经为您开了药。

您的医生可能出于其他原因开了它。

在你采取之前 维桑

当你不应该服用它时

如果您对以下物质过敏，请勿服用 Visanne：

- 地诺孕素（Visanne 中的活性成分）
- 列出的任何成分
本传单的结尾。

过敏反应的一些症状可能包括：

- 气促
- 喘息或呼吸困难
- 面部、嘴唇、舌头或身体其他部位肿胀
- 皮肤上出现皮疹、瘙痒或荨麻疹。

如果您有或曾经有血栓，请勿服用 Visanne：

- 腿部血管（深静脉血栓形成 - DVT）
- 肺（肺栓塞 - 肺栓塞）
- 心脏（心脏病发作）
- 大脑（中风）
- 身体的其他部位。

如果您担心血栓风险增加，请勿服用 Visanne。

血凝块很少见。极少数情况下，血栓可能会导致

严重的永久性残疾，甚至可能是致命的。

如果您有或曾经有过以下情况，请勿服用 Visanne：

- 糖尿病伴血管损伤
- 严重的肝病，您的肝功能尚未恢复正常
- 在性激素的影响下可能生长的癌症（例如乳房或生殖器官）
- 良性或恶性肝肿瘤
- 不明原因的阴道出血。

如果在服用 Visanne 时第一次出现这些情况，请立即停止服用并告诉您的医生。

如果您怀孕或认为您可能怀孕，请勿服用 Visanne。

开始前应排除怀孕的可能

维桑。

如果您是母乳喂养，请勿服用 Visanne。

不要把 Visanne 给孩子。

Visanne 不适用于初潮（第一次月经出血）前的女童。

不要在包装和泡罩上印刷的有效期后服用 Visanne。

有效期印在纸箱和每个泡罩上的“EXP”之后（例如 11 18 指 2018 年 11 月）。到期日是指该月的最后一天。如果它已过期，请将其返回给您的药剂师进行处理。

如果包装破损或有篡改迹象，请勿服用 Visanne。

如果包装损坏，请将其退回药剂师处理。

如果您不确定是否应该开始服用该药，请咨询您的医生。

在你开始服用之前

如果您对其他药物、食物、防腐剂或染料过敏，请告诉您的医生。

如果在存在下列任何条件的情况下使用 Visanne，您可能需要受到密切监督。您的医生可以向您解释这一点。因此，如果其中任何一项适用于您，请在开始使用 Visanne 之前告诉您的医生：

- 你抽烟
- 你超重
- 您患有糖尿病或在之前怀孕期间暂时患有糖尿病
- 你有高血压或发展为高血压
- 在服用 Visanne 时
- 你患有抑郁症
- 如果您有异位妊娠
- 您在服用 Visanne 时患上了肝病。症状可能包括皮肤或眼睛发黄或全身发痒。如果有，请告知您的医生
- 以前怀孕期间出现的症状
- 你有黄褐斑（皮肤上的黄褐色色素斑，尤其是面部）
 - 如果是这样，请避免暴露在阳光或紫外线辐射下
- 您或您的直系亲属中的任何人腿部或肺部出现血栓、心脏病发作、中风、乳腺癌或高胆固醇。

Visanne 含有乳糖—水合物。

如果您对某些糖不耐受，请在开始服用 Visanne 之前联系您的医生。

服用其他药物

如果您正在服用任何其他药物，请告诉您的医生或药剂师药物，包括您从药房、超市或保健食品店获得的任何非处方药。

某些药物/食品和 Visanne 可能会相互干扰。这些包括：

- 用于治疗癫痫的药物，例如苯妥英、扑米酮、巴比妥类药物（例如苯巴比妥），卡马西平，奥卡马西平、托吡酯、非尔氨酯
- 用于治疗抑郁症的药物，如氟西汀、氟伏沙明
- 地尔硫卓，维拉帕米，用于治疗高血压、胸痛或心律不齐的药物
- 用于治疗结核病的药物，如利福平、利福布丁
- 用于治疗 HIV 或丙型肝炎病毒 (HCV) 的药物
- 用于治疗真菌感染的药物，如酮康唑、伊曲康唑、氟康唑、伏立康唑)
- 一些抗生素（如红霉素、克拉霉素）
- 西咪替丁，一种抗酸剂
- 含有圣约翰草的草药
- 柚子。

这些药物/食物可能会受到 Visanne 的影响，或者可能会影响其效果。您的医生可能需要改变您的药物剂量，或开另一种药物。

在服用任何其他药物之前，请咨询您的医生或药剂师药物。

如何服用 维桑

仔细遵循医生或药剂师给您的所有指示。

它们可能与本传单中包含的信息不同。

如果您不理解包装上、药剂师标签或本宣传单上的说明，请咨询您的医生或

药剂师寻求帮助。

如何服用

每天大约在同一时间服用一粒药片，不间断。

按照泡罩包装上的箭头方向操作，直到服用所有药片。

可以在月经周期的任何一天开始服用片剂。

必须连续服用片剂，而不考虑阴道出血。这意味着在第一个包装完成后，应该不间断地开始下一个包装。

用水吞服整个药片。

无论您是在饭前还是饭后服用都没有关系。

Visanne 需要多长时间

只要您的医生告诉您，请继续服药。

这种药有助于控制您的病情，但不能治愈它。即使您感觉良好，继续服药也很重要。

如果你忘记带 Visanne

如果您忘记服用药片或出现呕吐和/或腹泻：

如果错过了药片或呕吐和/或腹泻（如果在服用药片后 3-4 小时内发生），Visanne 的功效可能会降低。如果错过了平板电脑，您应该只服用一个平板电脑，一旦您

记住，然后应该在第二天的平时继续服用平板电脑。因呕吐或腹泻而未吸收的药片也应换成一片。

如果您服用过多 (过量)

立即联系毒药信息中心 (澳大利亚: 13 11 26) 寻求建议, 或访问

事故和紧急情况最近的医院, 如果您认为您或其他任何人可能服用了过多的 Visanne。

即使没有不适或中毒的迹象, 也要这样做。您可能需要紧急医疗护理。

当你在服用维桑

你必须做的事情

告诉任何其他为您治疗的医生、牙医和药剂师您正在服用该药。

如果您即将进行任何血液检查, 请告诉您的医生您正在服用该药。它可能会干扰某些测试的结果。

如果您要进行手术, 请告诉外科医生或麻醉师您正在服用该药。

它可能会影响手术期间使用的其他药物。

保留所有医生的预约, 以便检查您的进展。

您的医生可能会不时进行一些测试, 以确保药物有效并防止不必要的副作用。

如果您在服用该药期间怀孕, 请立即告诉您的医生。

你不应该做的事情

除非您的医生告诉您, 否则不要服用 Visanne 来治疗任何其他投诉。

不要把你的药给任何人, 即使他们和你有同样的情况。

需要注意的事项

为避免怀孕, 您应该使用非激素

避孕措施, 例如避孕套或其他屏障方法。

您不得使用任何形式的避孕药 (片剂、贴片、宫内避孕药)

系统), 同时服用 Visanne。

不要使用节奏或温度的方法。这些方法可能不可靠。

如果在特殊情况下您应该在使用 Visanne 期间怀孕, 那么使用 Visanne 等含有孕激素的制剂的使用者发生异位妊娠的可能性更高 (胚胎在子宫外发育)。

在您开始服用 Visanne 之前, 请告诉您的医生, 如果您过去有过宫外孕, 或者输卵管功能受损。

如果您遇到无法解释的腹部不适, 这些不适与您通常从您的

子宫内异位症, 您应该立即联系您的医生, 因为必须考虑异位妊娠。

副作用

如果您在服用期间感觉不适, 请尽快告诉您的医生或药剂师

维桑。

所有药物都存在副作用。有时他们是认真的, 大多数时候他们不是。如果您有一些副作用, 您可能不需要就医。

不要对这个可能的副作用列表感到震惊, 您可能不会遇到任何副作用。

以下列表包括 Visanne 更常见的副作用。这些通常是温和的, 随着时间的推移而减轻。

如果您发现以下任何副作用并让您担心, 请告诉您的医生或药剂师:

- 头痛或偏头痛
- 乳房不适,
- 潮热
- 情绪变化, 包括抑郁、烦躁、紧张, 睡眠问题, 对性失去兴趣
- 痤疮、脱发
- 恶心、腹痛、风、腹部肿胀或呕吐
- 体重增加
- 背痛
- 子宫/阴道出血, 包括点滴出血
- 不寻常的弱点

如果您发现其他任何让您感到不适的情况, 请告诉您的医生或药剂师。

某些人也可能出现其他未列出的副作用。

血栓形成

血栓形成是血凝块的形成, 它可能会阻塞血液血管。

血栓有时发生在腿部深静脉 (DVT)。如果这种血凝块从形成它的静脉中分离出来, 它可能会到达并阻塞肺动脉, 导致肺栓塞 (PE)。

深静脉血栓形成是罕见的。无论您是否服用 Visanne, 它都会发展。如果您怀孕, 也可能发生这种情况。

使用 Visanne 等激素 (含孕激素) 制剂的使用者发生静脉血栓栓塞 (DVT 或 PE) 的风险似乎略高于非使用者, 但不如怀孕期间或使用联合口服制剂期间高

避孕药 (药丸)。

静脉血栓栓塞的风险增加，例如：

- 随着年龄的增长
- 如果你超重
- 分娩后不久
- 如果您过去有血栓
- 如果您的直系亲属中的任何人在相对较小的年龄有血栓
- 在长时间的固定过程中，例如在手术后或将您的腿贴上石膏/夹板等。

在任何预期的住院或手术之前，告诉您的医生您正在使用 Visanne。

您的医生可能会告诉您在手术前几周停止服用 Visanne，或者在固定时以及您何时可以再次开始服用 Visanne。

血栓也可能出现在心脏（导致心脏病发作）或大脑（导致中风）的血管中。

从研究来看，很少或没有证据表明含有类似于 Visanne 的孕激素制剂与心脏病发作或中风风险增加之间存在联系。

此类事件的风险与年龄增长有关，高血压（高血压）和吸烟。

在患有高血压的女性中，孕激素可能会略微增加中风的风险

含有 Visanne 等制剂。

如果您在使用 Visanne 时出现高血压，您可能会被告知停止使用它。

如果您发现可能有血栓迹象，请停止服用 Visanne 并咨询您的医生立即地。

血栓的可能迹象包括：

- 不寻常的咳嗽

- 胸部、手臂或胸骨下方疼痛
- 不适感辐射到背部
- 呼吸困难和/或呼吸困难
- 一只腿肿胀、疼痛或压痛
- 面部、手臂或腿部突然虚弱、麻木或“发麻”，尤其是在身体的一侧
- 突然行走困难、头晕、失去平衡或协调
- 剧烈，突然的胃痛
- 昏厥发作，或者你崩溃
- 比平时更严重的异常头痛或偏头痛
- 你的言语、理解力或视力突然出现问题

癌症

与不使用避孕药的同龄女性相比，使用复方口服避孕药（避孕药）的女性患乳腺癌的几率略高。不知道差异是由药丸引起的还是

服用避孕药的人较早发现癌症。

仅黄体酮制剂如 Visanne 的证据尚无定论。

定期检查乳房很重要，如果感觉有肿块，请联系医生。

在极少数情况下，服用避孕药的人报告了良性肝肿瘤，甚至更罕见的是恶性肝肿瘤。这些肿瘤可能导致内出血。

如果您的腹部有剧烈疼痛，请立即联系您的医生。

出血模式

Visanne 治疗会影响大多数女性的月经出血模式。

患有子宫腺肌病或子宫平滑肌瘤的女性的子宫出血可能在使用 Visanne 时更严重。

如果随着时间的推移大量出血并且持续不断，这可能会导致贫血（在某些情况下严重）。在这种情况下，您的医生可能会建议您停止服用 Visanne。

骨矿物质密度 (BMD)

长期使用 Visanne 可能会影响青少年（12 至 < 18 岁）的骨矿物质密度 (BMD)，因此您的医生会仔细权衡使用 Visanne 与其他药物的好处

骨质流失（骨质疏松症）的潜在风险，例如

- 代谢性骨病
- 如果您的直系亲属中有任何人患有骨质流失（骨质疏松症）
- 如果您曾经摔断过不是由跌倒或事故造成的骨头
- 使用可以减少骨量的药物，例如癫痫药物或类固醇
- 低体重指数或饮食失调，例如神经性厌食症或贪食症

- 酒精使用
- 抽烟

使用 Visanne 时，您的医生可能还会建议您调整饮食和生活方式，例如负重运动和健康饮食，包括充足的钙和维生素 D，以降低您患骨质疏松症的风险。向您的医生咨询他们的建议，以改善您的骨骼健康。

服用后 维桑

贮存

将您的药片放在泡罩包装中，直到需要服用为止。

如果您将药片从包装中取出，它们可能无法保存完好。

将平板电脑放在阴凉干燥的地方保持在 30°C 以下。

不要将 Visanne 或任何其他药物存放在浴室、水槽附近或窗台上。不要将药物留在车内。

高温和潮湿会破坏一些药物。

如果您的医生告诉您停止服用该药或到期

日期已过，请咨询您的药剂师如何处理剩余的藥物。

将任何未使用的藥物退还給您的药剂师。

产品 描述

它看起来像什么

Visanne 是一种圆形的白色至灰白色药片，一侧标有“B”。泡罩包装上标有星期几，包含 14 片。

Visanne 有 1 个月、3 个月和 6 个月的包装。并非所有包装尺寸都可以销售。

原料

有效成分：

- 地诺孕素 2mg

非活性成分：

- 乳糖一水合物
- 淀粉马铃薯
- 纤维素-微晶
- 聚维酮
- 纯化滑石
- 交聚维酮
- 硬脂酸镁

Visanne 片剂不含麸质、柠檬黄或偶氮染料。

供应商

德国制造：

拜耳澳大利亚有限公司
ABN 22 000 138 714
875 太平洋公路
新南威尔士州平布尔 2073

澳大利亚注册号：

维桑 - AUST R 160465

准备日期

2020 年 2 月 26 日

见 TGA 网站

(www.ebs.tga.gov.au) 了解最新信息
澳大利亚消费者医学信息。

® 的注册商标 德国拜耳集团

© 拜耳澳大利亚有限公司 版权所有

