



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : NPS

# VISANNE® (viz-Ahn) *dienogest*

## ANO ANG NASA ITO LEAFLET

Sinasagot ng leaflet na ito ang ilang karaniwang tanong tungkol sa Visanne. Hindi ito naglalaman ng lahat ng magagamit impormasyon. Hindi nito pinapalitan ang pakikipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko.

Ang lahat ng mga gamot ay may mga panganib at benepisyo. Natimbang ng iyong doktor ang mga panganib ng pag-inom mo ng Visanne laban sa mga benepisyong inaasahan nilang makukuha nito para sa iyo.

**Kung mayroon kang anumang mga alalahanin, o ay hindi sigurado sa pag-inom ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang payo.**

**Itago ang leaflet na ito kasama ng gamot.**

Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

## ANO ANG VISANNE

GINAGAMIT PARA SA

Ginagamit ang Visanne para sa paggamot ng mga masakit na sintomas ng endometrial lesions (displaced tissue ng lining ng sinapupunan).

Ang Visanne ay naglalaman ng progestogen hormone, dienogest.

Ang pag-inom ng isang tableta ng Visanne araw-araw ay humahantong sa pagliit ng endometrial tissue at binabawasan ang mga nauugnay na reklamo tulad ng pananakit ng pelvic at masakit na buwanang pagdurugo.

Tanungin ang iyong doktor kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kung bakit ito

**ang gamot ay inireseta para sa iyo.**

Maaaring inireseta ito ng iyong doktor para sa ibang dahilan.

## BAGO MO KUMUHA VISANNE

*Kapag hindi mo dapat kunin*

**Huwag uminom ng Visanne kung mayroon kang allergy sa:**

- dienogest (ang aktibong sangkap sa Visanne)
- alinman sa mga sangkap na nakalista sa dulo ng leaflet na ito.

Ang ilan sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ay maaaring kabilang ang:

- kinakapos na paghinga
- paghinga o hirap sa paghinga
- pamamaga ng mukha, labi, dila o iba pang bahagi ng katawan
- pantal, pangangati o pantal sa balat.

**Huwag uminom ng Visanne kung mayroon ka o nagkaroon ng namuong dugo sa:**

- ang mga daluyan ng dugo ng mga binti (deep vein thrombosis - DVT)
- ang mga baga (pulmonary embolism - PE)
- ang puso (atake sa puso)
- ang utak (stroke)
- ibang bahagi ng katawan.

**Huwag uminom ng Visanne kung nag-aalala ka tungkol sa mas mataas na panganib ng mga namuong dugo.**

Ang mga namuong dugo ay bihira. Paminsan-minsan ay maaaring maging sanhi ng mga pamumuo ng dugo

malubhang permanenteng kapansanan, o maaaring nakamamatay.

**Huwag uminom ng Visanne kung mayroon ka o nagkaroon ng:**

- diabetes mellitus na may pinsala sa daluyan ng dugo
- malubhang sakit sa atay at ang paggana ng iyong atay ay hindi bumalik sa normal
- kanser na maaaring lumaki sa ilalim ng impluwensya ng mga sex hormones (hal ng dibdib o ng mga genital organ)
- benign o malignant na tumor sa atay
- hindi maipaliwanag na pagdurugo ng ari.

**Kung ang alinman sa mga kundisyong ito ay lumitaw sa unang pagkakataon habang umiinom ng Visanne, itigil ang pag-inom nito kaagad at sabihin sa iyong doktor.**

**Huwag uminom ng Visanne kung ikaw ay buntis o sa tingin mo ay maaaring ikaw ay buntis.**

Ang posibilidad ng pagbubuntis ay dapat na ibukod bago magsimula Visanne.

**Huwag uminom ng Visanne kung ikaw ay nagpapasuso.**

**Huwag bigyan ng Visanne ang isang bata.**

Ang Visanne ay hindi para gamitin sa mga babaeng bata bago ang menarche (unang pagdurugo ng regla).

**Huwag uminom ng Visanne pagkatapos ng petsa ng pag-expire na naka-print sa pack at paltos.**

Ang petsa ng pag-expire ay naka-print sa karton at sa bawat paltos pagkatapos ng "EXP" (hal. 11 18 ay tumutukoy sa Nobyembre 2018). Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon. Kung ito ay nag-expire na, ibalik ito sa iyong parmasyutiko para itapon.

Huwag kumuha ng Visanne kung ang packaging ay napunit o nagpapakita ng mga palatandaan ng pakikialam.

Kung nasira ang packaging, ibalik ito sa iyong parmasyutiko para itapon.

**Kung hindi ka sigurado kung dapat mong simulan ang pag-inom ng gamot na ito, makipag-usap sa iyong doktor.**

### *Bago mo simulan itong kunin*

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang allergy sa anumang iba pang mga gamot, pagkain, preservative o tina.

Kung ang Visanne ay ginagamit sa pagkakaroon ng alinman sa mga kundisyon na nakalista sa ibaba ay maaaring kailanganin mong panatilihin sa ilalim ng malapit na pangangasiwa. Maaaring ipaliwanag ito sa iyo ng iyong doktor. Samakatuwid, kung ang alinman sa mga ito ay naaangkop sa iyo, sabihin sa iyong doktor bago simulan ang paggamit ng Visanne:

- manigarilyo ka
- ikaw ay sobra sa timbang
- mayroon kang diyabetis o nagkaroon ng diabetes pansamantala sa nakaraang pagbubuntis
- mayroon kang mataas na presyon ng dugo o nagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo habang kinukuha si Visanne
- ikaw ay dumanas ng depresyon
- kung nagkaroon ka ng ectopic pregnancy
- nagkakaroon ka ng sakit sa atay habang umiinom ng Visanne.  
Maaaring kasama sa mga sintomas paninilaw ng balat o mata o pangangatid sa buong katawan. Ipaalam din sa iyong doktor kung ganoon naganap ang mga sintomas sa nakaraang pagbubuntis
- mayroon kang chloasma (mga dilaw na kayumanggi pigmentation patch sa balat, lalo na sa mukha)
  - kung gayon, iwasan ang pagkakalantad sa araw o ultraviolet radiation
- ikaw o sinuman sa iyong malapit na pamilya ay nagkaroon ng mga namuong dugo sa mga binti o бага, atake sa puso, stroke, kanser sa suso o mataas na kolesterol.

### **Ang Visanne ay naglalaman ng lactose monohydrate.**

Kung mayroon kang hindi pagpaparaan sa ilang mga asukal, makipag-ugnayan sa iyong doktor bago mo simulan ang pagkuha ng Visanne.

### *Pag-inom ng iba pang mga gamot*

**Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka ng iba pa mga gamot, kabilang ang anumang nakukuha mo nang walang reseta mula sa iyong parmasya, supermarket o tindahan ng pagkain sa kalusugan.**

Ang ilang mga gamot/pagkain at Visanne ay maaaring makagambala sa isa't isa. Kabilang dito ang:

- mga gamot na ginagamit upang gamutin ang epilepsy tulad ng phenytoin, primidone, barbiturates (hal phenobarbitone), carbamazepine, oxcarbamazepine, topiramate, felbamate
- mga gamot na ginagamit upang gamutin ang depresyon tulad ng fluoxetine, fluvoxamine
- diltiazem, verapamil na mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo, pananakit ng dibdib o hindi regular na tibok ng puso
- mga gamot na ginagamit sa paggamot sa tuberculosis tulad ng rifampicin, rifabutin
- mga gamot na ginagamit upang gamutin ang HIV o hepatitis C virus (HCV)
- mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa fungal tulad ng ketoconazole, itraconazole, fluconazole, voriconazole)
- ilang antibiotics (hal. erythromycin, clarithromycin)
- cimetidine, isang antacid
- mga halamang gamot na naglalaman ng St. John's Wort
- suha.

Ang mga gamot/pagkain na ito ay maaaring maapektuhan ng Visanne, o maaaring makaapekto sa kung gaano ito gumagana. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang dosis ng iyong gamot, o magreseta ng ibang gamot.

**Humingi ng payo sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng iba pa gamot.**

## PAANO KUMUHA VISANNE

**Maingat na sundin ang lahat ng direksyon na ibinigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko.**

Maaaring iba ang mga ito sa impormasyong nakapaloob sa leaflet na ito.

**Kung hindi mo naiintindihan ang mga tagubilin sa pack, na naka-print sa label ng parmasyutiko o sa leaflet na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa tulong.**

### *Paano ito kunin*

Uminom ng isang tablet araw-araw sa halos parehong oras bawat araw, nang walang anumang pahinga.

Sundin ang direksyon ng mga arrow sa blister pack hanggang sa makuha ang lahat ng mga tablet.

Maaaring simulan ang pag-inom ng tableta sa anumang araw ng iyong regla.

Ang mga tableta ay dapat na patuloy na inumin nang walang pagsasaalang-alang sa pagdurugo ng vaginal. Nangangahulugan ito na pagkatapos ng unang pack ay tapos na ang susunod ay dapat magsimula nang walang pagkaantala.

**Lunukin nang buo ang tablet na may tubig.**

Hindi mahalaga kung inumin mo ito bago o pagkatapos kumain.

### *Gaano katagal ang pagkuha ng Visanne*

**Ipagpatuloy ang pag-inom ng iyong gamot hangga't sasabihin sa iyo ng iyong doktor.**

Nakakatulong ang gamot na ito na kontrolin ang iyong kondisyon, ngunit hindi ito gumagaling. Mahalagang ipagpatuloy ang pag-inom ng iyong gamot kahit na mabuti na ang pakiramdam mo.

### *Kung nakalimutan mong kunin ang Visanne*

**Kung nakalimutan mong uminom ng tableta o kung dumaranas ka ng pagsusuka at/o pagtatae:**

Ang bisa ng Visanne ay maaaring mabawasan sa kaganapan ng napalampas na mga tablet o pagsusuka at/o pagtatae (kung nangyari sa loob ng 3-4 na oras pagkatapos ng pag-inom ng tableta). Sa kaganapan ng (mga) napalampas na tablet, dapat kang uminom ng isang tablet lamang, sa sandaling ikaw ay

tandaan, at pagkatapos ay dapat magpatuloy sa pag-inom ng tablet sa iyong karaniwang oras sa susunod na araw. Ang isang tableta na hindi nasisipsip dahil sa pagsusuka o pagtatae ay dapat ding palitan ng isang tableta.

*Kung umiinom ka ng sobra (sobrang dosis)*

**Kaagad makipag-ugnayan sa Poisons Information Center (Australia: 13 11 26) para sa payo, o pumunta sa Aksidente at Emergency sa pinakamalapit na ospital, kung sa tingin mo na ikaw o sinuman ay maaaring uminom ng masyadong maraming Visanne.**

**Gawin ito kahit na walang mga palatandaan ng kakulangan sa ginhawa o pagkalason.**

Maaaring kailanganin mo ng agarang medikal na atensyon.

---

## HABANG KAYO KUMUKUHA NG VISANNE

---

*Mga bagay na dapat mong gawin*

**Sabihin sa sinumang ibang doktor, dentista, at parmasyutiko na gumagamot sa iyo na iniinom mo ang gamot na ito.**

**Kung magkakaroon ka ng anumang mga pagsusuri sa dugo, sabihin sa iyong doktor na iniinom mo ang gamot na ito.**

Maaari itong makagambala sa mga resulta ng ilang mga pagsubok.

**Kung operahan ka, sabihin sa surgeon o anesthetist na iniinom mo ang gamot na ito.**

Maaari itong makaapekto sa iba pang mga gamot na ginagamit sa panahon ng operasyon.

**Panatilihin ang lahat ng appointment ng iyong doktor upang masuri ang iyong pag-unlad.**

Ang iyong doktor ay maaaring gumawa ng ilang mga pagsusuri paminsan-minsan upang matiyak na ang gamot ay gumagana at upang maiwasan ang mga hindi gustong epekto.

**Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng gamot na ito, sabihin kaagad sa iyong doktor.**

*Mga bagay na hindi mo dapat gawin*

Huwag uminom ng Visanne upang gamutin ang anumang iba pang mga reklamo maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor.

**Huwag ibigay ang iyong gamot sa sinuman, kahit na mayroon silang parehong kondisyon tulad mo.**

*Mga bagay na dapat ingatan*

Upang maiwasan ang pagbubuntis, dapat mong gamitin ang non-hormonal pag-iingat sa pagpipigil sa pagbubuntis, tulad ng condom o ibang paraan ng hadlang.

Hindi ka dapat gumamit ng sex-hormone na naglalaman ng mga contraceptive sa anumang anyo (tablet, patch, intrauterine system) habang kumukuha ng Visanne.

Huwag gumamit ng mga pamamaraan ng ritmo o temperatura.

Ang mga pamamaraang ito ay maaaring hindi mapagkakatiwalaan.

Kung sa isang pambihirang kaso dapat kang mabuntis sa panahon ng paggamit ng Visanne, may mas mataas na posibilidad sa mga gumagamit ng progestogen na naglalaman ng mga paghahanda tulad ng Visanne na magkaroon ng ectopic pregnancy (ang embryo ay bubuo sa labas ng sinapupunan).

Sabihin sa iyong doktor bago mo simulan ang pagkuha ng Visanne, kung mayroon kang isang ectopic na pagbubuntis sa nakaraan, o may kapansanan sa paggana ng mga fallopian tubes.

Kung nakakaranas ka ng hindi maipaliwanag na mga reklamo sa tiyan na iba sa mga sintomas na karaniwan mong nararanasan mula sa iyo endometriosis, dapat kang makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor dahil isang dapat isaalang-alang ang ectopic pregnancy.

---

## SIDE EFFECTS

---

**Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko sa lalong madaling panahon kung hindi maganda ang pakiramdam mo habang umiinom ka Visanne.**

Ang lahat ng mga gamot ay maaaring magkaroon ng mga side effect. Minsan seryoso sila, kadalasan hindi. Maaaring hindi mo kailangan ng medikal na atensyon kung nakakuha ka ng ilan sa mga side effect.

**Huwag maalarma sa listahang ito ng mga posibleng epekto, maaaring hindi mo maranasan ang alinman sa mga ito.**

Kasama sa sumusunod na listahan ang mas karaniwang mga side effect ng Visanne. Ang mga ito ay karaniwang banayad at nababawasan sa paglipas ng panahon.

**Kung mapapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na side effect at nag-aalala sila sa iyo, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko:**

- sakit ng ulo o migraine
- kakulangan sa ginhawa sa dibdib,
- hot flushes
- mga pagbabago sa mood, kabilang ang depresyon, pagkamayamutin, nerbiyos, problema sa pagtulog, pagkawala ng interes sa sex
- acne, pagkawala ng buhok
- pagduduwal, pananakit ng tiyan, hangin, namamagang tiyan o pagsusuka
- Dagdag timbang
- sakit sa likod
- pagdurugo ng may isang ina/ vaginal kasama ang spotting
- hindi pangkaraniwang kahinaan

**Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung may napansin kang anumang bagay na nagpapasama sa iyong pakiramdam.**

Ang iba pang mga side effect na hindi nakalista ay maaari ding mangyari sa ilang mga tao.

## Trombosis

Ang trombosis ay ang pagbuo ng isang namuong dugo na maaaring humarang sa isang dugo sisidlan.

Minsan nangyayari ang trombosis sa ang malalim na ugat ng mga binti (DVT). Kung ang namuong dugo na ito ay humiwalay mula sa mga ugat kung saan ito nabuo, maaari itong umabot at humarang sa mga arterya ng baga, na magdulot ng pulmonary embolism (PE).

Ang malalim na venous thrombosis ay isang bihirang pangyayari. Maaari itong bumuo kung umiinom ka man o hindi ng Visanne. Maaari rin itong mangyari kung ikaw ay buntis.

Ang panganib ng venous thromboembolism (DVT o PE) ay lumilitaw na bahagyang mas mataas sa mga gumagamit ng hormonal (naglalaman ng progestogen) na mga paghahanda tulad ng Visanne, kaysa sa mga hindi gumagamit, ngunit hindi kasing taas ng sa panahon ng pagbubuntis o sa paggamit ng pinagsamang oral.

mga contraceptive (ang Pill).

Ang panganib para sa venous thromboembolism ay tumataas halimbawa:

- sa pagtaas ng edad
- kung ikaw ay sobra sa timbang
- ilang sandali pagkatapos ng panganganak
- kung mayroon kang namuong dugo sa nakaraan
- kung sinuman sa iyong malapit na pamilya ay nagkaroon ng namuong dugo sa medyo maagang edad
- sa mahabang panahon ng immobilizations, hal. pagkatapos ng operasyon o pagkakaroon ng iyong (mga) binti sa plaster/splints atbp.

Sabihin sa iyong doktor na gumagamit ka ng Visanne nang maaga sa anumang inaasahang pag-ospital o operasyon.

Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na itigil ang pag-inom ng Visanne ilang linggo bago ang operasyon, o sa oras ng immobilization at kapag maaari mong simulan muli ang Visanne.

Ang mga namuong dugo ay maaari ding mangyari sa mga daluyan ng dugo ng puso (nagdudulot ng atake sa puso) o sa utak (nagdudulot ng stroke).

Mula sa mga pag-aaral ay kakaunti o walang katibayan para sa isang link sa pagitan ng progesterone na naglalaman ng mga paghahanda na katulad ng Visanne at isang mas mataas na panganib ng atake sa puso o stroke.

Ang panganib ng naturang mga kaganapan ay medyo nauugnay sa pagtaas ng edad, **hypertension (high blood pressure), at paninigarilyo.**

Sa mga babaeng may hypertension ang panganib ng stroke ay maaaring bahagyang tumaas ng progesterone naglalaman ng mga paghahanda tulad ng Visanne.

Kung nagkaroon ka ng mataas na presyon ng dugo habang gumagamit ng Visanne, maaaring sabihin sa iyo na ihinto ang paggamit nito.

**Kung mapapansin mo ang mga posibleng palatandaan ng namuong dugo, itigil ang pag-inom ng Visanne at kumunsulta sa iyong doktor kaagad.**

Ang mga posibleng palatandaan ng namuong dugo ay kinabibilangan ng:

- isang hindi pangkaraniwang ubo

- sakit sa dibdib, braso o sa ibaba ng breastbone
- kakulangan sa ginhawa na lumalabas sa likod
- paghinga at/o hirap sa paghinga
- pamamaga, pananakit o lambot ng isang binti
- biglaang panghihina, pamamanhid o masamang 'pin at karayom' ng mukha, braso o binti, lalo na sa isang bahagi ng katawan
- biglaang problema sa paglalakad, pagkahilo, pagkawala ng balanse o koordinasyon
- matinding, biglaang pananakit ng tiyan
- nanghihina na pag-atake, o babagsak ka
- hindi pangkaraniwang pananakit ng ulo o migraine na mas malala kaysa karaniwan
- biglaang mga problema sa iyong pananalita, pang-unawa o paningin

## Kanser

Ang kanser sa suso ay bahagyang mas madalas na na-diagnose sa mga kababaihang gumagamit ng pinagsamang oral contraceptive (ang Pill) kaysa sa mga babaeng nasa parehong edad na hindi gumagamit ng Pill. Hindi alam kung ang pagkakaiba ay sanhi ng Pill o kung mas maagang natukoy ang mga kanser sa mga gumagamit ng Pill.

Ang ebidensya ay walang tiyak na paniniwala para sa mga paghahanda lamang ng progesterone tulad ng Visanne.

**Mahalaga na regular mong suriin ang iyong mga suso at makipag-ugnayan sa iyong doktor kung nakakaramdam ka ng anumang bukol.**

Sa mga bihirang kaso, ang mga benign na tumor sa atay at mas bihira, ang mga malignant na tumor sa atay ay naiulat sa mga gumagamit ng Pill. Ang mga tumor na ito ay maaaring humantong sa panloob na pagdurugo.

**Makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang matinding pananakit sa iyong tiyan.**

## Mga Pattern ng Pagdurugo

Ang paggamot sa Visanne ay nakakaapekto sa pattern ng pagdurugo ng regla sa karamihan ng mga kababaihan.

Ang pagdurugo ng matris sa mga babaeng may eg adenomyosis uteri o uterine leiomyomata, ay maaaring mas malala sa Visanne.

**Kung ang pagdurugo ay mabigat at tuluy-tuloy sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa anemia (malubha sa ilang mga kaso). Sa ganitong mga kaso, maaaring payuhan ka ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng Visanne.**

## Bone Mineral Density (BMD)

Ang pangmatagalang paggamit ng Visanne ay maaaring makaapekto sa bone mineral density (BMD) ng mga kabataan (12 hanggang <18 taon) at samakatuwid ay maingat na titimbangan ng iyong doktor ang mga benepisyo ng paggamit ng Visanne laban sa iba

mga potensyal na panganib para sa pagkawala ng buto (osteoporosis) hal

- metabolic bone disease
- kung sinuman sa iyong malapit na pamilya ang nakaranas ng pagkawala ng buto (osteoporosis)
- kung nabalian ka ng buto na hindi sanhi ng pagkahulog o aksidente
- paggamit ng mga gamot na maaaring magpababa ng buto eg gamot sa epilepsy o steroid
- mababang body mass index o mga karamdaman sa pagkain eg anorexia nervosa o bulimia
- paggamit ng alak
- paninigarilyo

Kapag gumagamit ng Visanne, ang iyong doktor ay maaari ring magrekomenda ng mga pagbabago sa diyeta at pamumuhay tulad ng pag-eheersisyo sa timbang at isang malusog na diyeta kabilang ang sapat na calcium at bitamina D, upang mabawasan ang iyong panganib ng osteoporosis. Tanungin ang iyong doktor para sa kanilang payo upang mapabuti ang iyong kalusugan ng buto.

---

## PAGKATAPOS KUMUHA VISANNE

---

### *Imbakan*

**Itago ang iyong mga tablet sa blister pack hanggang sa oras na upang inumin ang mga ito.**

Kung ilalabas mo ang mga tablet mula sa pack ay maaaring hindi ito mapanatili nang maayos.

**Panatilihin ang iyong mga tablet sa isang cool na tuyo na lugar kung saan ang temperatura nananatili sa ibaba 30°C.**

**Huwag mag-imbak ng Visanne o anumang iba pang gamot sa banyo, malapit sa lababo, o sa window-sill. Huwag mag-iwan ng gamot sa kotse.** Maaaring sirain ng init at basa ang ilan mga gamot.

Kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na itigil ang pag-inom ng gamot na ito o ang pag-expire Lumipas na ang petsa, tanungin ang iyong parmasyutiko kung ano ang gagawin sa anumang gamot na natitira.

**Ibalik ang anumang hindi nagamit na gamot sa iyong parmasyutiko.**

---

## PRODUKTO PAGLALARAWAN

---

### *Kung ano ang hitsura nito*

Ang Visanne ay isang bilog, puti hanggang puti na tablet na may markang "B" sa isang gilid. Ang blister pack ay minarkahan ng mga araw ng linggo at naglalaman ng 14 na tablet.

Ang Visanne ay dumating sa mga pakete ng 1 buwan, 3 buwan at 6 na buwan. Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

### *Mga sangkap*

Mga aktibong sangkap:

- dienogest 2mg

Mga hindi aktibong sangkap:

- lactose monohydrate
- patatas na almirol
- cellulose-microcrystalline
- povidone
- purified talc
- crospovidone
- magnesiyo stearate

Ang mga tablet ng Visanne ay hindi naglalaman ng gluten, tartrazine o azo dyes.

### *Supplier*

Ginawa sa Germany para sa:

Bayer Australia Ltd  
ABN 22 000 138 714  
875 Pacific Highway  
Pymble NSW 2073

### *Australian registration number:*

Visanne - AUST R 160465

### *Petsa ng Paghahanda*

26 Pebrero 2020

Tingnan ang website ng TGA

([www.ebs.tga.gov.au](http://www.ebs.tga.gov.au)) para sa pinakabago

Australian Consumer Medicine Impormasyon.

® Nakarehistrong trademark ng Bayer group, Germany

© Bayer Australia Ltd Lahat ng karapatan ay nakalaan

