



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Digoksin

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682301.html>

Digoksin

(di jox'in) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Digoksin, kalp yetmezliğini ve anormal kalp ritimlerini (aritmiler) tedavi etmek için kullanılır. Kalbin daha iyi çalışmasına yardımcı olur ve kalp atış hızınızı kontrol etmenize yardımcı olur.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Digoksin, ağızdan alınacak bir tablet, kapsül veya pediatrik iksir (sıvı) olarak gelir. Digoksin genellikle günde bir kez alınır. Pediatrik iksir, dozu ölçmek için özel olarak işaretlenmiş bir damlalık ile birlikte gelir. Zorlanırsanız, eczacınızdan nasıl kullanacağınızı göstermesini isteyin. Her zaman aynı marka digoksin almanız önemlidir. Farklı digoksin markaları farklı miktarlarda aktif ilaca sahiptir ve dozunuzun değiştirilmesi gerekir.

Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Digoksini aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Digoksin, durumunuzu kontrol etmeye yardımcı olur, ancak onu iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile digoksin almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan digoksin almayı bırakmayınız.

bu ilacın kullanım alanları

Digoksin ayrıca kalp ağrısını (anjina) tedavi etmek için kullanılır ve kalp krizinden sonra kullanılabilir. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın olası riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç başka kullanımlar için reçete edilebilir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Digoksin almadan önce,

- digoksin, digitoksin veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.
- doktorunuza ve eczacınıza, özellikle antasitler, antibiyotikler, kalsiyum, kortikosteroidler, diüretikler ('su hapları'), kalp hastalığı için diğer ilaçlar, tiroid ilaçları ve vitaminler olmak üzere hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları aldığınızı söyleyin.

- Doktorunuza tiroid problemlerinizi, kalp aritmilerinizi, kanser veya böbrek hastalığınız olup olmadığını söyleyin.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Digoksin alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.
- 65 yaşında veya daha büyükseniz, bu ilacı almanın riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla konuşun. Daha yüksek dozlar ciddi yan etkilere neden olabileceğinden, daha yaşlı yetişkinler genellikle düşük dozlarda digoksin almalıdır.
- Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize digoksin aldığınızı söyleyin.
- Bu ilacın uykunuzu getirebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.
- alkolün bu ilacın neden olduğu uyuşukluğu artırabileceğini unutmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz düşük sodyumlu (düşük tuzlu) bir diyet ve potasyum takviyesi önerebilir. Sodyum oranı düşük ve potasyum oranı yüksek gıdaların bir listesini eczacınıza veya doktorunuza sorun. Tüm diyet talimatlarını dikkatlice izleyin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Digoksin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- baş dönmesi veya baş dönmesi
- uyuşukluk
- görme değişiklikleri (bulanık veya sarı)
- döküntü
- düzensiz kalp atışı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın:

- mide bulantısı
- kusma
- ishal
- iştah kaybı

- ayakların veya ellerin şişmesi
- olağandışı kilo alımı
- nefes almada zorluk

Ciddi bir yan etki yaşıyorsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kaptaki, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefonda zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuzun digoksine cevabınızı belirlemesi gerekecektir. Periyodik olarak elektrokardiyogram (EKG) ve kan tahlilleriniz olabilir ve dozunuzun ayarlanması gerekebilir. Doktorunuz nabzınızı (kalp atış hızınızı) kontrol etmenizi isteyebilir. Nabzınızı nasıl ölçeceğinizi eczacınıza veya doktorunuza sorun. Nabzınız olması gerekenden daha hızlı veya daha yavaşsa doktorunuzu arayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorun.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- Cardoksin®
- Digitek®
- Lanoksikaplar®
- lanoksin®

Son Revize - 06/15/2017

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022