



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 地高辛

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682301.html>

地高辛

发音为 (di jox' in)

为什么要开这种药?

地高辛用于治疗心力衰竭和心律失常（心律失常）。它有助于心脏更好地工作，并有助于控制您的心率。

这个药应该怎么用?

地高辛以片剂、胶囊或儿科长生不老药（液体）的形式口服。地高辛通常每天服用一次。儿科药剂配有一个特别标记的滴管，用于测量剂量。如果您有困难，请让您的药剂师向您展示如何使用它。重要的是您始终服用相同品牌的地高辛。不同品牌的地高辛含有不同量的活性药物，您的剂量需要改变。

仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用地高辛。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

地高辛有助于控制您的病情，但不会治愈它。即使您感觉良好，也要继续服用地高辛。不要在未咨询医生的情况下停止服用地高辛。

该药的其他用途

地高辛也用于治疗心脏疼痛（心绞痛），并可在心脏病发作后使用。与您的医生讨论使用这种药物治疗您的病情可能存在的风险。

这种药物可用于其他用途。请向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

服用地高辛前，

- 如果您对地高辛、地高辛或任何其他药物过敏，请告诉您的医生和药剂师。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用哪些处方药和非处方药，尤其是抗酸剂、抗生素、钙、皮质类固醇、利尿剂（“水丸”）、其他治疗心脏病的药物、甲状腺药物和维生素。

- 如果您有或曾经有过甲状腺问题、心律失常、癌症或肾病，请告诉您的医生。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在服用地高辛期间怀孕，请致电您的医生。
- 如果您年满 65 岁或以上，请与您的医生讨论服用这种药物的风险和益处。老年人通常应该接受低剂量的地高辛，因为高剂量可能会导致严重的副作用。
- 如果您正在接受手术，包括牙科手术，请告诉医生或牙医您正在服用地高辛。
- 你应该知道这种药物可能会让你昏昏欲睡。在您知道这种药物如何影响您之前，请勿驾驶汽车或操作机器。
- 请记住，酒精会增加这种药物引起的嗜睡。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

您的医生可能会推荐低钠（低盐）饮食和钾补充剂。向您的药剂师或医生索取一份低钠高钾食物的清单。仔细遵循所有的饮食指导。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

地高辛可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 头晕目眩
- 睡意
- 视力变化（模糊或黄色）
- 皮疹
- 心律不齐

一些副作用可能很严重。如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生：

- 胃部不适
- 呕吐
- 腹泻
- 食欲不振

- 脚或手肿胀
- 不寻常的体重增加
- 呼吸困难

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] 或通过电话 (1-800-332-1088))。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。

<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生需要确定您对地高辛的反应。您可能会定期进行心电图 (EKG) 和血液检查，您的剂量可能需要调整。您的医生可能会要求您检查脉搏（心率）。请您的药剂师或医生教您如何测量脉搏。如果您的脉搏比应有的更快或更慢，请致电您的医生。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 卡多辛[®]
- 数码科技[®]
- 兰诺昔胶囊[®]
- 兰诺辛[®]

最后修订 - 2017 年 6 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS[®]患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会[®]，4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 U.S. Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Page last updated: 25 March 2022