Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682301.html

Digoxine

prononcé comme (di jox' in)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La digoxine est utilisée pour traiter l'insuffisance cardiaque et les rythmes cardiaques anormaux (arythmies). Il aide le cœur à mieux fonctionner et il aide à contrôler votre fréquence cardiaque.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La digoxine se présente sous forme de comprimé, de capsule ou d'élixir pédiatrique (liquide) à prendre par voie orale. La digoxine est généralement prise une fois par jour. L'élixir pédiatrique est livré avec un compte-gouttes spécialement marqué pour mesurer la dose. Si vous avez des difficultés, demandez à votre pharmacien de vous montrer comment l'utiliser. Il est important que vous preniez toujours la même marque de digoxine. Différentes marques de digoxine contiennent différentes quantités de médicament actif et votre dose devra être modifiée.

Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la digoxine exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

La digoxine aide à contrôler votre état mais ne le guérira pas. Continuez à prendre de la digoxine même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre de la digoxine sans en parler à votre médecin.

autres utilisations de ce médicament

La digoxine est également utilisée pour traiter les douleurs cardiaques (angine de poitrine) et peut être utilisée après une crise cardiaque. Discutez avec votre médecin des risques possibles de l'utilisation de ce médicament pour votre état.

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages. Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre de la digoxine,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la digoxine, à la digitoxine ou à tout autre médicament.
- informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, en particulier des antiacides, des antibiotiques, du calcium, des corticostéroïdes, des diurétiques («diurétiques»), d'autres médicaments pour les maladies cardiaques, des médicaments pour la thyroïde et des vitamines.

- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu des problèmes de thyroïde, des arythmies cardiaques, un cancer ou une maladie rénale.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de la digoxine, appelez votre médecin.
- parlez à votre médecin des risques et des avantages de la prise de ce médicament si vous avez 65 ans ou plus. Les personnes âgées doivent généralement recevoir de faibles doses de digoxine, car des doses plus élevées peuvent provoquer des effets secondaires graves.
- si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez de la digoxine.
- vous devez savoir que ce médicament peut vous rendre somnolent. Ne conduisez pas de voiture et ne faites pas fonctionner de machines tant que vous ne savez pas comment ce médicament vous affecte.
- n'oubliez pas que l'alcool peut augmenter la somnolence causée par ce médicament.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Votre médecin peut recommander un régime pauvre en sodium (faible en sel) et un supplément de potassium. Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une liste d'aliments faibles en sodium et riches en potassium. Suivez attentivement toutes les instructions diététiques.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La digoxine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- étourdissements ou étourdissements
- somnolence
- changements de vision (floue ou jaune)
- éruption
- rythme cardiaque irrégulier

Certains effets secondaires peuvent être graves. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin :

- maux d'estomac
- vomissement
- diarrhée
- perte d'appétit

- gonflement des pieds ou des mains
- prise de poids inhabituelle
- difficulté à respirer

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA). (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin devra déterminer votre réponse à la digoxine. Vous pouvez avoir des électrocardiogrammes (EKG) et des tests sanguins périodiquement, et votre dose peut devoir être ajustée. Votre médecin peut vous demander de vérifier votre pouls (fréquence cardiaque). Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin de vous apprendre à prendre votre pouls. Si votre pouls est plus rapide ou plus lent qu'il ne devrait l'être, appelez votre médecin.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Cardoxine®
- Digitek®
- Lanoxcaps®
- Lanoxine®

Dernière révision - 15/06/2017

Apprenez à citer cette page

Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022