Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613028.html

Fumarate de diméthyle

prononcé comme (dye meth' il fue' ma rate)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le fumarate de diméthyle est utilisé pour traiter les adultes atteints de diverses formes de sclérose en plaques (SEP ; une maladie dans laquelle les nerfs ne fonctionnent pas correctement et les personnes peuvent ressentir de la faiblesse, des engourdissements, une perte de coordination musculaire et des problèmes de vision, d'élocution et de contrôle de la vessie) y compris:

- syndrome cliniquement isolé (CIS ; épisodes de symptômes nerveux qui durent au moins 24 heures),
- formes récurrentes-rémittentes (évolution de la maladie où les symptômes se manifestent de temps à autre), ou
- formes progressives secondaires (évolution de la maladie où les rechutes surviennent plus souvent).

Le fumarate de diméthyle appartient à une classe de médicaments appelés activateurs Nrf2. Il agit en diminuant l'inflammation et en prévenant les lésions nerveuses susceptibles de provoquer des symptômes de sclérose en plaques.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le fumarate de diméthyle se présente sous la forme d'une capsule à libération retardée (libère le médicament dans l'intestin pour empêcher la dégradation du médicament par les acides gastriques) à prendre par la bouche. Il est généralement pris deux fois par jour. Prenez du fumarate de diméthyle à peu près aux mêmes heures chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez le fumarate de diméthyle exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Le fumarate de diméthyle peut être pris avec ou sans nourriture. Cependant, si vous prenez du fumarate de diméthyle avec de la nourriture ou avec une aspirine à enrobage non entérique (325 mg ou moins) 30 minutes avant de prendre du fumarate de diméthyle, il y a moins de chance que vous ressentiez des bouffées vasomotrices pendant votre traitement.

Avalez les gélules entières; ne les mâchez pas et ne les écrasez pas. Ne pas ouvrir les gélules ni saupoudrer le contenu sur les aliments.

Votre médecin vous prescrira probablement une faible dose de fumarate de diméthyle et augmentera votre dose après 7 jours.

Le fumarate de diméthyle peut aider à contrôler la sclérose en plaques, mais ne la guérira pas. Continuez à prendre du fumarate de diméthyle même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre du fumarate de diméthyle sans en parler à votre médecin.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Le fumarate de diméthyle est également parfois utilisé pour traiter le psoriasis (une maladie de la peau dans laquelle des plaques rouges et squameuses se forment sur certaines zones du corps). Discutez avec votre médecin des risques liés à l'utilisation de ce médicament pour votre état.

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre du fumarate de diméthyle,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au fumarate de diméthyle, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les gélules de fumarate de diméthyle. Demandez à votre pharmacien ou consultez les informations patient du fabricant pour obtenir une liste des ingrédients.
- informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- informez votre médecin si vous avez tout type d'infection, y compris les infections qui vont et viennent et les infections chroniques qui ne disparaissent pas, ou si vous avez ou avez déjà eu la varicelle ou l'herpès zoster (zona; une éruption cutanée qui peut survenir chez les personnes qui ont avait la varicelle dans le passé); ou un faible nombre de globules blancs.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du fumarate de diméthyle, appelez votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le fumarate de diméthyle peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- chaleur, rougeur, démangeaisons ou brûlure de la peau
- diarrhée
- nausée
- vomissement
- brûlures d'estomac

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, arrêtez de prendre du fumarate de diméthyle et appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

- difficulté à avaler ou à respirer
- gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des yeux, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes
- urticaire
- éruption
- démangeaison
- enrouement
- problèmes de vue
- faiblesse d'un côté du corps ou maladresse des bras ou des jambes qui s'aggrave avec le temps
- changements de vision
- changements dans votre pensée, votre mémoire ou votre conscience qui entraînent de la confusion et des changements de personnalité
- fatigue extrême, perte d'appétit, douleur dans le coin supérieur droit de l'estomac, urine foncée ou jaunissement de la peau ou des yeux
- faiblesse d'un côté du corps qui s'aggrave avec le temps; maladresse des bras ou des jambes; des changements dans votre pensée, votre mémoire, votre marche, votre équilibre, votre élocution, votre vue ou votre force qui durent plusieurs jours ; maux de tête; convulsions; confusion; ou changements de personnalité
- brûlure, picotements, démangeaisons ou sensibilité cutanée d'un côté du corps ou du visage avec éruption cutanée douloureuse ou cloques apparaissant plusieurs jours plus tard

Le fumarate de diméthyle peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA). (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la lumière, de la chaleur excessive et de l'humidité (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, le

La meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire un test sanguin avant de commencer votre traitement et peut prescrire certains tests de laboratoire pendant votre traitement pour vérifier la réponse de votre corps au fumarate de diméthyle.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Tecfidera®

autres noms

- DMF

Dernière révision - 15/09/2020

Apprenez à citer cette page

Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022