



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Donepezil

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697032.html>

Donepezil

pronunciado como (doe nep' e zil)

por que este medicamento é prescrito?

Donepezil é usado para tratar a demência (um distúrbio cerebral que afeta a capacidade de lembrar, pensar com clareza, comunicar e realizar atividades diárias e pode causar alterações no humor e na personalidade) em pessoas com doença de Alzheimer (DA; uma doença cerebral que destrói lentamente a memória e a capacidade de pensar, aprender, comunicar e lidar com as atividades diárias). Donepezil está em uma classe de medicamentos chamados inibidores da colinesterase. Melhora a função mental (como memória, atenção, capacidade de interagir com os outros, falar, pensar com clareza e realizar atividades diárias regulares) aumentando a quantidade de uma certa substância natural no cérebro. Donepezil pode melhorar a capacidade de pensar e lembrar ou retardar a perda dessas habilidades em pessoas com DA. No entanto,

como este medicamento deve ser usado?

Donepezil vem como um comprimido e um comprimido de desintegração oral (comprimido que se dissolve rapidamente na boca) para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma vez ao dia com ou sem alimentos, à noite, antes de dormir. Tome donepezil por volta da mesma hora todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome donepezil exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Donepezil ajuda a controlar os sintomas da doença de Alzheimer, mas não a cura. Continue a tomar donepezil mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar donepezil sem falar com o seu médico.

O seu médico pode começar com uma dose baixa de donepezil e aumentar a sua dose após 4 a 6 semanas. O seu médico pode aumentar a sua dose novamente 3 ou mais meses depois.

Engula o comprimido de 23 mg inteiro; não parta, esmague ou mastigue. Informe o seu médico se não conseguir engolir o comprimido inteiro.

Para tomar o comprimido de desintegração oral, coloque o comprimido na língua e espere que se dissolva. Beba um pouco de água após a dissolução do comprimido.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar donepezil,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao donepezil, a qualquer medicamento de piperidina, a qualquer outro medicamento, a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de donepezil ou comprimidos de desintegração oral. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico se você não souber se um medicamento ao qual você é alérgico é um medicamento de piperidina. Pergunte ao seu farmacêutico ou verifique as informações do paciente do fabricante para obter uma lista dos ingredientes.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: anti-histamínicos; aspirina e outros fármacos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) tais como ibuprofeno (Advil, Motrin) e naproxeno (Aleve, Naprosyn); betanecol (Duvoid, Urecolina); carbamazepina (Tegretol); dexametasona (Decadron, Dexone); ipratrópio (Atrovent); cetoconazol (Nizoral); medicamentos para glaucoma, doença do intestino irritável, enjôo, miastenia gravis, doença de Parkinson, úlceras ou problemas urinários; fenobarbital (Luminal, Solfoton); fenitoína (Dilantin); quinidina (Quinidex); e rifampina (Rifadin, Rimactane). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- informe o seu médico se você pesa menos de 55 kg e se você tem ou já teve sangramento no estômago ou intestinos; uma úlcera; batimentos cardíacos irregulares, lentos ou rápidos, convulsões; dificuldade em urinar; asma; doença pulmonar obstrutiva crônica (um grupo de doenças pulmonares incluindo bronquite crônica ou enfisema); ou doença renal, hepática ou cardíaca.
- informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar donepezilo, contacte o seu médico.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o seu médico ou dentista que está a tomar donepezilo.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você esquecer de tomar uma dose de donepezil, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular.

Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida. Se você não tomar donepezil, por 1 semana ou mais, você deve ligar para o seu médico antes de começar a tomar este medicamento novamente.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Donepezil pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- náusea
- vômito

- diarreia
- perda de apetite
- perda de peso
- micção frequente
- dificuldade em controlar a micção
- câibras musculares
- dor nas articulações, inchaço ou rigidez
- dor
- cansaço excessivo
- dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo
- dor de cabeça
- tontura
- nervosismo
- depressão
- confusão
- mudanças de comportamento ou humor
- alucinações (ver coisas ou ouvir vozes que não existem)
- sonhos anormais
- pele vermelha, escamação e coceira

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

- desmaio
- batimento cardíaco lento
- dor no peito
- problemas respiratórios novos ou agravados
- dor de estômago nova ou agravada ou azia
- fezes pretas ou alcatroadas
- sangue vermelho nas fezes
- vômito sangrento
- vômito que parece borra de café
- dificuldade em urinar ou dor ao urinar
- dor na região lombar

- febre
- convulsões
- descoloração ou hematomas da pele

Donepezil pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de overdose podem incluir o seguinte:

- náusea
- vômito
- babando
- sudorese
- batimento cardíaco lento
- dificuldade para respirar
- fraqueza muscular
- desmaio
- convulsões

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Aricept®
- Aricept®ODT
- Namzaric®(como um produto combinado contendo donepezila, memantina)

Última revisão - 15/12/2017

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS® Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022