Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608015.html

Inyección de doripenem

pronunciado como (dor'' i pen' em)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de doripenem se usa para tratar infecciones graves de las vías urinarias, los riñones y el abdomen causadas por bacterias. La inyección de doripenem no está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar la neumonía que se desarrolló en personas que estaban conectadas a un ventilador en un hospital. La inyección de doripenem pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos carbapenem. Funciona matando bacterias.

Los antibióticos como la inyección de doripenem no funcionarán para los resfriados, la gripe u otras infecciones virales. Tomar antibióticos cuando no son necesarios aumenta el riesgo de contraer una infección más adelante que resista el tratamiento con antibióticos.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de doripenem viene como un líquido que se inyecta por vía intravenosa (en una vena). Por lo general, se administra cada 8 horas. La duración de su tratamiento depende del tipo de infección que se esté tratando. Después de que su condición mejore, su médico puede cambiarlo a otro antibiótico que pueda tomar por vía oral para completar su tratamiento. Puede recibir la inyección de doripenem en un hospital o puede administrar el medicamento en casa. Si está usando la inyección de doripenem en casa, úsela aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Use la inyección de doripenem exactamente como se indica. No use más o menos cantidad ni lo use con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Debería comenzar a sentirse mejor durante los primeros días de tratamiento con la inyección de doripenem. Si sus síntomas no mejoran o empeoran, llame a su médico.

Use la inyección de doripenem hasta que termine la receta, incluso si se siente mejor. Si deja de usar la inyección de doripenem demasiado pronto u omite dosis, es posible que su infección no se trate por completo y que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de usar la inyección de doripenem,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la inyección de doripenem; otros antibióticos carbapenem como imipenem/cilastatina (Primaxin) o meropenem (Merrem); penicilinas; antibióticos de cefalosporina como cefaclor, cefadroxilo, cefuroxima (Ceftin, Zinacef) o cefalexina (Keflex); aztreonam (Azactam); o cualquier otro medicamento.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. No olvide mencionar los siguientes: probenecid (Probalan, en Col-Probenecid) y ácido valproico (Depakene). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- informe a su médico si tiene alguna alergia y si tiene o alguna vez ha tenido un accidente cerebrovascular, convulsiones o enfermedad renal.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras usa la inyección de doripenem, llame a su médico.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Use la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No use una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de doripenem puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- dolor de cabeza
- náuseas
- Diarrea
- enrojecimiento, dolor o hinchazón en el lugar de la inyección

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato:

- urticaria
- Comezón
- erupción
- ampollas en la piel, la boca, la nariz y los ojos
- desprendimiento (desprendimiento) de la piel
- fiebre
- dificultad para respirar o tragar

- convulsiones
- heces acuosas o con sangre (hasta 2 meses después de su tratamiento)
- cansancio excesivo
- debilidad
- dificultad para respirar
- piel pálida

El doripenem puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono (1-800-332-1088).

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo a la inyección de doripenem.

No permita que nadie más tome su medicamento. Si aún tiene síntomas de infección después de terminar la inyección de doripenem, hable con su médico.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Doribax®

Última revisión - 15/09/2016

Aprende a citar esta página

Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022